



팍스로비드 복용방법 및 유의사항은?

[팍스로비드 환자 및 보호자용 설명서]

Q&A

Q1.

팍스로비드를 복용하기 전에
의료전문가에게 알려야 할 사항은 무엇인가요?

A1.

① 귀하가 다음에 해당하는 경우에는 의료전문가에게 알리세요.

- ▲ 알레르기가 있는 경우
- ▲ 간질환 또는 신장질환이 있는 경우
- ▲ 임신했거나 임신 예정인 경우
- ▲ 수유 중인 경우
- ▲ 기타 중대한 질환이 있는 경우

② 현재 복용 중인 모든 의약품에 대해 의료전문가에게 알리세요.

③ 복합 호르몬 피임제를 복용하는 경우 의료전문가에게 알리세요.

임신 가능성이 있는 여성은 다른 효과적인 대체 피임법이나
추가적인 기구 피임법을 사용해야 합니다.

귀하에게 적합한 피임법에 대해 문의가 있는 경우 의료전문가와 상담하세요.

Q2.

팍스로비드는 어떻게 복용하나요?

A2.

팍스로비드는 니르마트렐비르와 리토나비르라는 2가지 의약품이 함께 포장되어 있습니다.

- ① 분홍색 니르마트렐비르 정제 2개와 흰색 리토나비르 정제 1개를 1일 2회(아침과 저녁) 5일간 복용합니다.

각 복용 시마다, 정제 3개를 모두 동시에 복용하세요.

- ② 신장 질환이 있는 경우 의료전문가와 상담하세요.

용량 조절이 필요할 수 있습니다.



Q3.

팍스로비드는 복용 시
유의해야 할 사항이 있나요?

A3.

- ① 정제를 씹거나 부수지 말고, 통째로 삼키세요.
- ② 식사 여부에 관계없이 팍스로비드를 복용하세요.
- ③ 상태가 좋다고 느끼더라도, 의료전문가와 상의 없이
팍스로비드의 복용을 중단하지 마세요.
- ④ 팍스로비드 복용을 잊은 경우, 기존 복용 시간에서 8시간이 지나지 않았다면
기억나는 즉시 복용하세요. 8시간 이상 복용을 잊은 경우에는 놓친 용량을
건너뛰고 다음 회차 용량을 정해진 시간에 복용하세요.
한꺼번에 두 배의 용량을 복용하지 마세요.
- ⑤ 5일 후에 상태가 악화되거나 상태가 좋지 않다고 느낀다면
의료전문가와 상의하세요.

Q4.

임신 중이거나 수유 중인 경우에는
어떻게 하나요?

A4.

임신부 또는 수유 중인 산모를 팩스로비드로 치료한 경험은 없습니다.

임신부와 태아의 경우, 팩스로비드 복용의 유익성이
치료의 위험성보다 클 수 있습니다.

임신 중인 경우에는 귀하가 선택할 수 있는
옵션과 특정 상황에 대해서 의료전문가와 상담하세요.

팩스로비드를 복용하는 동안에는 성생활을 자제하거나 효과적인 기구 피임법을
사용하도록 권장됩니다.

수유 중이라면, 귀하가 선택할 수 있는 옵션과 특정 상황에 대해서
의료전문가와 상담하세요.



Q5.

“팍스로비스” 복용 후 남은 약을 판매할 수 있나요?

A5.

상태가 좋아지더라도 5일간 복용하여야 합니다.

복용 후 남은 약을 판매(가족 등에게 무상 수여하는 경우 포함)하는 행위는 의약품 불법 판매에 해당하여 처벌 받을 수 있으며, 불법판매를 알선하거나 광고하는 행위도 처벌대상입니다.

* (불법판매) 5년 이하의 징역 또는 5천만원이하의 벌금

* (불법판매 알선·광고) 1년 이하의 징역 또는 1천만원이하의 벌금



Q6.

팍스로비드를 어떻게 보관해야 하나요?

A6.

팍스로비드 정제를 15°C ~ 30°C의 실온에서 보관하세요.

Q7.

코로나 19에 대해 더 자세히 알려면
어떻게 해야 하나요?

A7.

- ① 의료전문가에게 문의하세요.
- ② 질병관리청(<https://www.kdca.go.kr>) 홈페이지에 방문하십시오.